

ROYAUME DU MAROC

OFFICE MAROCAIN DE LA PROPRIETE (19)
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE



المملكة المغربية

المكتب المغربي
للملكية الصناعية والتجارية

(12) FASCICULE DE BREVET

(11) N° de publication :
MA 30127 B1

(51) Cl. internationale :
A01H 00/00

(43) Date de publication :
02.01.2009

(21) N° Dépôt :
30012

(22) Date de Dépôt :
18.06.2007

(71) Demandeur(s) :
DRISCOLL STRAWBERRY ASSOCIATES, INC., 345 Westridge Drive Watsonville CA 95076 (US)

(72) Inventeur(s) :
CARLOS D. FEAR ; GAVIN SILLS ; FRED M. COOK ; RICHARD E. HARRISON

(74) Mandataire :
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY (TMP AGENTS)

(54) Titre : **PLANTE DE MÛRE SAUVAGE NOMMEE ' DRISCOLL EUREKA '**

(57) Abrégé : La présente invention concerne un cultivar nouveau et distinctif de plante de ronce commune appelée Driscoll Eureka. Le nouveau cultivar est distingué des autres cultivars de ronce commune par sa saison précoce, faible exigence de froid, qualité améliorée et caractéristiques d'expédition. Le nouveau cultivar est distingué de son parent de semence par le fait d'être précoce et possède un fruit à goût meilleur; il se distingue de son parent pollinisateur par son goût meilleur.

(57) RESUME

La présente invention concerne un cultivar nouveau et distinctif de plante de ronce commune appelée Driscoll Eureka. Le nouveau cultivar est distingué des autres cultivars de ronce commune par sa saison précoce, faible exigence de froid, qualité améliorée et caractéristiques d'expédition. Le nouveau cultivar est distingué de son parent de semence par le fait d'être précoce et possède un fruit à goût meilleur; il se distingue de son parent pollinisateur par son goût meilleur.

02 JAN 2009

N° 30127

3 0 1 2 7

PLANTE DE MÛRE SAUVAGE NOMMÉE ' DRISCOLL EUREKA

Contexte de l'invention

La présente invention concerne un nouveau cultivar de ronce commune appelé « Driscoll Eureka ». Le nouveau cultivar a été développé par l'hybridation du cultivar femelle "Zorro" (Demande du Brevet Américain série numéro 09/772.327) avec la variété mâle non brevetée « BY45.1 ». Les parents ont été croisés en 1996, où après les fruits et semences aient été collectés pour produire des semis pour leur mis en terre à Watsonville, Calif. En 1997. Le nouveau cultivar a été sélectionné en 1998 pour son bon goût et la solidité de fruit. Le cultivar a été propagé de façon asexuelle à Watsonville, Calif. Et reproduit conforme aux plantes types par une culture de du bout de la pousse in vitro.

RESUMEE DE L'INVENTION

La présente invention fournit un cultivar nouveau et distinct de ronce commune appelé « Driscoll Eureka ». La variété est connue botaniquement par *Rubus* L. sous genre *Rubus*. La variété est un hybride complexe *Rubus*, qui peut être caractérisée en tant que tetraploïde droit avec un contexte considérable de *R. allegheniensis* avec des autres espèces telles que *R. trivialis*, *R. argutus* et *R. ulmifolius* figurant aussi dans son contexte. Le nouveau cultivar produit une récolte de tige fructifère qui commence en mai et continu jusqu'à fin de juillet. La nouvelle variété de ronce commune est distinguée des autres variétés par un nombre de caractéristiques décrites dans le tableau 1. En particulier, le nouveau cultivar est distingué par sa saison précoce, sa faible exigence en froid, sa qualité améliorée et les caractéristiques d'expédition.

COMPARAISON AUX VARIETES SIMILAIRES

La variété que nous croyons être similaire à « Driscoll Eureka » de celles que nous connaissons est « Olallie », une variété non brevetée. « Driscoll Eureka » diffère particulièrement de « Olallie » par le fait d'avoir un mûrissage anticipé, avoir un goût acide et ayant une meilleur solidité de fruit. La comparaison détaillée supplémentaire de « Driscoll Eureka » à « Olallie » et « Chester » est présentée dans le Tableau 1.

DESCRIPTION BREVE DES DESSINS

Les photographies d'accompagnement montrent des spécimens typiques des fruits, feuilles et rejets du nouveau cultivar, en couleur aussi presque vrai comme raisonnement possible dans les illustrations de couleur de ce type.

FIG 1. est une photographie montrant une mise à fruit latérale de « Driscoll Eureka » avec un fruit à des divers stades de développement.

FIG 2. est une photographie montrant une vue de gros plan de rejeton de la tige végétative, la feuille mature et la tige de « Driscoll Eureka ».

DESCRIPTION DE LA NOUVELLE VARITEE

La description détaillée suivante du nouveau cultivar de ronce commune, « Driscoll Eureka », est basé sur les observations enregistrées des plantes âgées de 2 à 5 ans et de la croissance de fruit entre 2000 et 2002 à Watsonville, Calif., et il est supposé d'appliquer aux plantes du cultivar « Driscoll Eureka » cultivées dans des conditions similaires de sol et un climat ailleurs. Les plantes ont été plantées dans un sol fumigé précédemment avant levée et fertilisé et irrigué de manière régulière par un système d'irrigation goutte à goutte. La description est conformément à la terminologie utilisée par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV). Dans toutes ces spécifications, les noms de couleurs commençant avec une petite lettre minuscule signifient que le nom de la couleur, comme utilisé dans le langage commun, est une descriptive avec justesse. Les données de couleur commençant avec une lettre majuscule et suivies par un code alphanumérique indiquent les désignations de couleur les plus similaires tel que fourni par Royal Horticultural Society (RHS) Colour Chart publié par la Société Royale

d'Horticulture de Londres, Angleterre. Les désignations de couleur, les descriptions de couleur, et les autres descriptions phénotypiques peuvent s'écarter des valeurs et des descriptions prescrites selon la variation dans les conditions de l'environnement, saisonnières, climatiques et culturelles.

CARACTERISTIQUES DE LA NOUVELLE VARIETE

Le tableau 1 fournit des informations sur les caractéristiques de la plante et du fruit du nouveau cultivar de ronce commune "Driscoll Eureka", comparées aux caractéristiques des cultivars de ronce commune non brevetés « Olallie » et « Chester ». « Olallie » et « Chester » sont actuellement à la fois des cultivars importants pour l'expédition fraîche au marché, et son ainsi comparables à l'utilisation proposée de la nouvelle invention, « Driscoll Eureka ». Les observations de « Driscoll Eureka », « Olallie » et « Chester » ont été prises dans une comparaison côte à côte entre 2001 et 2002.

Le fruit du nouveau cultivar est caractérisé particulièrement et distingué des autres cultivars par son goût amélioré ses caractéristiques d'expédition. « Driscoll Eureka » est modérément productif et produit la plupart de sa récolte du début de la saison de récolte. Les cannes de « Driscoll Eureka » sont vigoureuses, épineuses et ont des bourgeons avec une faible exigence au froid. La hauteur moyenne de la plante est environ 279 cm et l'envergure moyenne de la plante est environ 169 cm.

La couleur de pigmentation du style est 143B. Le nombre moyen des styles par fleur est environ 112, la couleur de pigmentation d'anthère est 155A, et le nombre moyen d'anthères par fleur est environ 121. le nombre de pétales par fleur est cinq. La couleur de pigmentation de sépale est 144A. la couleur des semences de « Driscoll Eureka » est 152C et le poids moyen de semence est 2,9 mg.

« Driscoll Eureka » est distingué de son parent de semence, « Zorro » par le fait d'être précoce et ayant un fruit de meilleur goût.

Tableau 1

Caractéristiques de la plante « Driscoll Eureka »

<u>GENERAL</u>	Eureka	Driscoll Chester	Olallie
Vitalité	Modérée-Elevée	Elevée	Modérée-Elevée
Habitude de croissance	Demi-debout	Demi-debout	Étendue
Productivité	Modérée	Elvée	Élevée
Auto-fertilité	Auto-fertile	Auto-fertile	Auto-fertile
Nombre des rejetons jeunes	Précoce	Tard	Précoce
CANNES			
<u>Tige végétative</u>			
Pigmentation des jeunes rejetons	Faible	Moyenne	Faible
Glucosité (la pruline)	Absente ou faible	Moyenne	Faible
Section transversale de la canne (de mi canne de tige végétative)	Angulaire à cannelée	Angulaire à cannelée	Arrondie à angulaire
Couleur de la canne inactive	Brune à violet	Violette brune	Brune à brune violet
Les épines	Présentes	Absentes	Présentes
Pigmentation	Violet	-	Violet
Couleur	164A	-	187A
Densité des jeunes rejetons	Moyenne	-	Moyenne
Attitude de la cime	Descendante	-	Descendante à horizontale

Taille	Moyenne	-	Moyenne
Taille : longueur (de base à la cime) (mm)	3,4	-	3,0
Texture	Lisse	-	Dense
Présence et distribution des pétioles	Présentes	-	Présentes
Pubescence dans les cannes	Présente	Présente	Présente
Feuilles			
Relief entre les nervures	Moyenne	Faible	Moyenne
Nombre de folioles	Habituellement 5	Habituellement 5	Parfois 3, parfois 5
Brillance	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Sections transversales de feuille	Concave	Concave à plat	Concave
Folioles terminales			
Longueur (cm)	8,6	10,7	9,1
Largeur (cm)	7,2	8,3	7,9
Forme	Ovée	Ovée	Ovée
La cime	Acuminée	Acuminée	Acuminée
La base	Cordiforme	Cordiforme	Cordiforme
La marge	Doublement dentelée	Doublement dentelée	Doublement dentelée
Foliole latérale			
Longueur (cm)	7,9	9,2	8,4
Largeur (cm)	5,5	6,4	6,3
Forme	Ovée	Ovée	Ovée
Cime	Acuminée	Acuminée	Acuminée
Base	Arrondie à cordiforme	Arrondie	Arrondie
Marge	Doublement dentelée	Doublement dentelée	Doublement dentelée
Longueur de rachis (entre la foliole terminale et les folioles latérales adjacentes)	3,0	3,0	2,5
Chevauchement des folioles latérales	Chevauchant	Chevauchant	Chevauchant
Pétiole			
Longueur (cm)	6,2	5,9	3,9
Pigmentation de la surface supérieure	Rouge Violet/bordeaux	Rouge Violet/bordeaux	Gris à légèrement rose
Pigmentation de dessous	Jaune gris 146A	Jaune gris	Jaune gris
Orientation de stipule	Serrage	Debout	Serrage à debout
Couleur			
Face	147A	146A	146A
Dessous	147A	146A	146A
Fleurs			
Temps de la période de floraison de début de floraison	Très tard	Très tard	Précoce
Taille de fleur	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Diamètre de fleur (cm)	4,8	4,3	4,3
Nombre de fleur (au 3 ^{ème} nœud de la cime latérale, distance et moyenne)	5,0	9,5	4,2

Pétale			
Longueur (cm)	2,3	2,0	2,0
Largeur (cm)	1,7	1,4	1,3
Pédicelle			
Coloration	Absente	Faible	Très faible
Longueur (cm)	2,4	1,8	-
FRUIT			
Saison de récolte de fruit	Précoce	Tard	Précoce
Couleur	Noir	Noir	Noir
Immature	187A	187-A	187-B
Mûrissement	202A	202-A	202-A
Fruit mature	202A	202-A	202-A
Brillance	Forte	Moyenne	Moyenne
Forme	Ovée	Arrondie à ovée	Ovée étroite
Dimensions			
Taille du fruit	Moyenne	Petite	Moyenne
Longueur (cm)	2,3	2,1	2,9
Largeur (cm)	2,0	2,0	1,7
Poids (g/fruit)	4,2	3,6	4,7
Solides solubles (%)	11,9	9,6	10,4
Indice d'acide (% comme acide citrique) (ml de .1 NaOH ajouté à pH 8.1)	1.34	1,84	2.06
Nombre de drupéoles par fruit	61	46	86
Solidité	Stable	Stable	Douce

CARTOGRAPHIE D'ACIDE NUCLEIQUE

Les modèles distinctifs de polymorphisme peuvent être détectés en utilisant une variété de procédés d'analyse d'acide nucléique. Dans un exemple non limitant, les cartes génétiques moléculaires peuvent être produites en utilisant une empreinte d'ADN polymorphe à amplification aléatoire (RAPD) (Williams et al., 1990, «les polymorphismes d'ADN amplifiées par des amorces arbitraire sont utiles en tant que marqueurs génétiques», Nucleic Acids Res. 18(22):6531-5). L'utilisation d'une variété d'amorces oligonucléotides, seuls ou en combinaison, analyse de RAPD de « Driscoll Eureka», « Chester», et « Olallie» a produit des modèles de fragment d'ADN qui distingue seulement chacun de ces génotypes génétiquement distincts.

Nous revendiquons :

1. Un cultivar nouveau et distinctif de plante de ronce commune, substantiellement comme montré et décrit.